

Boletim Epidemiológico

Ano 2024, nº 5, março de 2024

Subsecretaria de Vigilância à Saúde | Secretaria de Saúde do Distrito Federal

Monitoramento da Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave no Distrito Federal até a Semana Epidemiológica 10 de 2024

Apresentação

Este boletim é produzido quinzenalmente pela Gerência de Vigilância das Doenças Imunopreveníveis e de Transmissão Hídrica e Alimentar (GEVITHA) da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVEP), da Subsecretaria de Vigilância à Saúde (SVS) da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), cujo objetivo é apresentar o cenário epidemiológico da Síndrome Gripal (SG) nas unidades sentinelas, da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e das hospitalizações por covid-19 notificados no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) bem como propor recomendações para subsidiar as ações de vigilância, prevenção e controle da influenza, SARS-CoV-2 e outros vírus respiratórios no Distrito Federal (DF).

Com a pandemia da covid-19 em 2020, a vigilância da influenza e dos vírus respiratórios no Distrito Federal foi reestruturada e ampliada em decorrência da necessidade de adaptação ao cenário de crise. Atualmente a operacionalização da vigilância da influenza e de outros vírus respiratórios no Distrito Federal dá-se da seguinte forma:

1. **Vigilância da Síndrome Gripal em unidades sentinelas:** identificação, notificação, investigação e coleta de amostras laboratoriais (swab de nasofaringe) dos casos de SG atendidos nas unidades sentinelas.
2. **Vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave:** identificação, notificação, investigação e coleta de amostras laboratoriais (swab de nasofaringe) dos casos de SRAG hospitalizados (> 24 horas) ou óbitos por SRAG independentemente do local de ocorrência.

Este informativo está estruturado em 4 tópicos divididos da seguinte forma: 1. Vigilância sentinela da síndrome gripal; 2. Vigilância da SRAG; 3. Perfil dos casos de SRAG por vírus respiratórios e 4. Perfil das hospitalizações por covid-19 em 2024 (dados preliminares até a SE 10 - 31/12/2023 a 09/03/2024), utilizando como fonte de dados o sistema de informação SIVEP-Gripe.

Importante ressaltar que a redução do número de notificações nas últimas duas semanas epidemiológicas (SE) está possivelmente relacionada ao intervalo entre o tempo da identificação do caso e a sua inserção no sistema de informação da vigilância epidemiológica da gripe, o que torna os dados preliminares e sujeitos a alterações.

Resumo do Boletim até a Semana Epidemiológica 10 de 2024

- O vírus SARS-CoV-2 (108) e o Rinovírus (48) tem predominado entre as amostras positivas das unidades sentinelas.
- Crescimento de casos de síndrome gripal por SARS-CoV-2 a partir da SE 05.
- O ano de 2024 iniciou com a notificação de casos de SRAG inferior ao que vinha sendo notificado nas últimas semanas de 2023, porém apresentando aumento a partir da SE 02, atingindo o pico na SE 09.
- Os casos de SRAG corresponderam a: 16,8% por SARS-CoV-2, 11,3% por VSR, 1,1% por Influenza e 55,6% não especificado. Observa-se aumento de casos de SRAG por SARS-CoV-2 e VSR nas últimas semanas.
- Os casos em crianças de zero a 10 anos correspondem a 60,5% das notificações de SRAG.
- Houve notificação de 1 óbito de SRAG por Influenza e 6 por SARS-CoV-2.
- Aumento de casos hospitalizados por covid-19 a partir da SE 05, atingindo o máximo na SE 08.
- O maior número de casos hospitalizados de covid-19 e óbitos por 100 mil habitantes foi na faixa etária 80 anos e mais.

1. Vigilância Sentinela da Síndrome Gripal (SG)

A vigilância sentinela é realizada em serviços de saúde com demanda espontânea e tem como principal objetivo o monitoramento da circulação dos vírus respiratórios causadores da síndrome gripal (indivíduo com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e com início dos sintomas nos últimos 7 dias) na comunidade.

Atualmente as unidades sentinelas de síndrome gripal são:

- ✓ UBS 02 Asa Norte

✓ UBS 12 Samambaia

✓ UPA Ceilândia I

✓ Hospital Brasília Lago Sul
- ✓ UBS 01 São Sebastião

✓ UBS 01 Santa Maria

✓ UPA N. Bandeirante

✓ Hospital Materno Infantil
- ✓ UBS 05 Planaltina

Em 2023, com o objetivo de intensificar o monitoramento dos vírus respiratórios no Distrito Federal, o Hospital Materno Infantil de Brasília voltou a integrar a vigilância sentinela, a UBS 01 Paranoá foi substituída pela UBS 01 São Sebastião e a UPA Ceilândia I foi inserida na rede sentinela (Deliberação nº 27, de 23 de agosto de 2023 do Plenário do Colegiado de Gestão, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal).


As unidades sentinelas devem informar semanalmente, por meio do preenchimento de formulário específico disponível no SIVEP-Gripe, a proporção de atendimentos de casos por síndrome gripal, em relação ao total de casos atendidos na unidade de saúde durante a semana epidemiológica. A análise desse indicador possibilita monitorar oportunamente o aumento de atendimentos por SG, em relação às outras doenças, e assim observar situações de surtos ou início de epidemias por vírus respiratórios de importância em saúde pública.

Os dados apresentados na Figura 1 referem-se aos atendimentos ocorridos em 2023 e 2024, respectivamente, apenas nas unidades básicas de saúde (UBS) que são sentinelas, porque as demais (UPA e Hospital) estão se adequando quanto à extração e lançamento dos dados no sistema de informação.

Em 2023, pode-se observar um aumento de atendimentos por síndrome gripal a partir da SE 05/2023, reforçando a sazonalidade dos vírus respiratórios nessa época (outono/inverno). A partir da SE 13/2023, alcança uma estabilidade e redução percentual dos atendimentos por síndrome gripal nas semanas seguintes.

Em 2024, também se observa um aumento na proporção de atendimentos por síndrome gripal a partir da SE 5/2024.

Figura 1. Proporção dos atendimentos por síndrome gripal nas unidades sentinelas, Distrito Federal, 2023 e 2024 até a SE 10.



Fonte: SIVEP Gripe, acesso em 11/03/2024. Sujeitos à alteração.

Para as análises do presente tópico foram selecionados os casos com sintomas gripais, atendidos nas unidades sentinelas, que coletaram amostras e foram notificados independente de preencherem a definição de caso de síndrome gripal.


Em 2023, foram coletadas 2.499 amostras, sendo 1.102 (44,1%) resultados positivos para vírus respiratórios. O vírus SARS-CoV-2 (350) e Rinovírus (234) predominaram entre as amostras positivas das unidades sentinelas. A Influenza A (173), Influenza B (217) e o vírus sincicial respiratório (97) circularam nas primeiras semanas do ano.

Em relação a 2024, até a SE 10 (março), foram realizadas 510 coletas nas nove unidades sentinelas de SG:

- ✓ 180 amostras detectáveis (35,3%);
- ✓ 308 amostras não detectáveis (negativas) ou inconclusivas (60,4%);
- ✓ 22 amostras aguardam encerramento da notificação (4,3%);

Entre as amostras positivas, foi detectado o vírus SARS-CoV-2 (108), Rinovírus (48), Vírus Sincicial Respiratório (10), Metapneumovírus (6), Influenza A (13) e Adenovírus (1) (**Figura 2**).

Figura 2. Frequência de amostras coletadas em unidades sentinelas, segundo semana epidemiológica do início dos sintomas. Distrito Federal, 2023 e 2024 até a SE 10.



*36 codeteções = (05) VSR + SARS-CoV-2, (01) Influenza B + Rinovírus, (02) Influenza A + Rinovírus, (05) Influenza A + SARS-CoV-2; (07) Influenza B + SARS-CoV-2; (02) Influenza A + VSR; (01) Influenza A + B + rinovírus; (02) Influenza B + VSR; (01) Influenza B + metapneumovírus; (01) Influenza A + parainfluenza 1; (03) SARS-CoV-2 + Rinovírus; (02) Adenovírus + Rinovírus; (02) VSR + Rinovírus; (01) SARS-CoV-2 + metapneumovírus; (01) Influenza B + Rinovírus

*6 codeteções = (1) SARS-CoV-2 + VSR, (5) SARS-CoV-2 + Rinovírus

Fonte: SIVEP Gripe, acesso em 11/03/2024. Sujeitos à alteração.

O Ministério da Saúde, por meio da NOTA TÉCNICA Nº 13/2023-CGVDI/DIMU/SVSA/MS publicada em março de 2023, apresenta as orientações para a estratégia e operacionalização da coleta de amostras no contexto da vigilância sentinela de síndrome gripal, sendo recomendada a coleta de até **VINTE AMOSTRAS SEMANAIS**, em cada unidade sentinela de SG e o indicador de amostras coletadas semanalmente passa a ser classificado conforme o quadro abaixo:

Classificação do indicador das amostras coletadas semanalmente nas unidades sentinelas de síndrome gripal.

Número de coletas semanais	Classificação do indicador
10 a 20	Excelente
7 a 9	Muito bom
4 a 6	Bom
1 a 3	Baixo
0	SI*

*Sem informação sobre coleta de amostras.

Fonte: CGVDI/SVSA/MS, 2023

As análises apresentadas abaixo mostram o total acumulado de coletas realizadas em cada unidade sentinela em 2024 e o indicador semanal, conforme apresentado anteriormente na tabela de classificação. Para o cálculo do indicador foi utilizada a média de coletas das duas últimas semanas.

Não houve registro de coleta nas duas últimas semanas no Hospital Brasília Lago Sul e UPA Ceilândia I. Quatro unidades apresentaram o indicador “Excelente”. O indicador final do DF ficou classificado em “Muito Bom” (**Tabela 1**).

Tabela 1. Número de coletas realizadas em casos de síndrome gripal, média semanal, classificação do indicador de coletas, segundo unidade sentinela. Distrito Federal, 2024 até a SE 10.

Unidade Sentinela	Total de coletas	Média semanal	Indicador
UBS 02 Asa Norte	53	16	Excelente
UBS 01 São Sebastião	93	11	Excelente
UBS 05 Planaltina	36	3	Baixo
UBS 12 Samambaia	10	2	Baixo
UBS 01 Santa Maria	168	20	Excelente
HMIB	47	8	Muito Bom
Hospital Brasília Lago Sul	0	0	SI
UPA N. Bandeirante	97	12	Excelente
UPA I Ceilândia	6	0	SI
TOTAL	510	8	Muito Bom

*Média semanal de coletas das duas últimas semanas epidemiológicas.
Fonte: SIVEP Gripe, acesso em 11/03/2024. Sujeitos à alteração.

2. Vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)

A vigilância universal da SRAG foi iniciada em 2009 frente aos casos humanos de influenza A (H1N1pdm09) e visa identificar o perfil dos casos hospitalizados e óbitos de SRAG. Este segundo tópico refere-se às análises dos casos que apresentaram os critérios, descritos abaixo, para SRAG hospitalizado em residentes do Distrito Federal.

Definição de caso de SRAG: Indivíduo hospitalizado (> 24 horas) que apresentou pelo menos um sinal ou sintoma gripal (febre - mesmo que referida - OU calafrios OU dor de garganta OU dor de cabeça OU tosse OU coriza OU distúrbios olfativos OU gustativos) associado a pelo menos um sinal de gravidade (dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto). Para os óbitos por SRAG não há o critério de hospitalização maior que 24 horas.


Em 2023, foram notificados 7.173 casos e 275 (3,8%) óbitos. Houve um aumento no número de casos a partir da SE 05 (fevereiro), atingindo o ápice na SE 12 (março) com a notificação de 264 casos e 15 óbitos.

Em 2024, dos 752 casos de SRAG notificados, 626 (83,2%) são residentes do Distrito Federal. Quando comparado ao ano anterior, iniciou com o número de notificações de casos de SRAG inferior às últimas semanas de 2023. Contudo, vem apresentando um aumento em especial nas SE 08 e 09 quando foi registrado o maior número de casos de SRAG com 93 notificações na SE 09. (**Figura 3**).

Quando compara-se o acumulado de casos (626) e óbitos (19) de SRAG nas 10 primeiras semanas epidemiológicas de 2024 em relação ao mesmo período de 2023, observa-se:

- decréscimo de 61,8% dos casos de SRAG (1.638).
- decréscimo de 66,1% dos óbitos de SRAG (56).

Figura 3. Distribuição dos casos e óbitos de SRAG, segundo semana epidemiológica do início dos sintomas, de residentes do Distrito Federal. Distrito Federal, 2023 e 2024 até a SE 10.





Fonte: SIVEP Gripe, acesso em 11/03/2024. Sujeitos à alteração. SRAG: Síndrome Respiratória Aguda Grave.

Em relação à identificação do agente etiológico, em 2023, os casos de SRAG corresponderam a: 17,9% por VSR, 13,3% por SARS-CoV-2 e 5,2% por Influenza. O VSR circulou predominantemente nas vinte primeiras semanas. Observa-se um aumento no número de casos de SRAG por influenza a partir da SE 11 (março) até a SE 27 (julho). A partir da SE 33 (agosto) identifica-se um aumento no número de casos de SRAG por SARS-CoV-2. Importante frisar também o elevado número de casos de SRAG não especificado, ou seja, que não se identificou o vírus respiratório, alcançando 61,1% das amostras em 2023.

Em 2024, observa-se um aumento no número de casos de SRAG por VSR e SARS-CoV-2 a partir da SE 05. Os casos de SRAG corresponderam a: 16,8% por SARS-CoV-2, 11,3% por VSR, 1,1% por Influenza e 55,6% não especificado. (**Figura 4**).

Figura 4. Distribuição dos casos de SRAG, segundo agente etiológico e semana epidemiológica do início dos sintomas, de residentes do Distrito Federal. Distrito Federal, 2023 e 2024 até a SE 10.







Fonte: SIVEP Gripe, acesso em 11/03/2024. Sujeitos à alteração. SRAG: Síndrome Respiratória Aguda Grave. *Pode-se identificar mais de um vírus respiratório em um mesmo paciente (co-deteccões).

Quanto a faixa etária, em 2023, observa-se um predomínio dos casos hospitalizados de SRAG entre crianças até 10 anos (68,5%), ocasionados predominantemente pelo VSR. Em 2024, os casos em crianças de zero a 10 anos correspondem a 60,5% das notificações. (Figura 5).

Figura 5. Distribuição dos casos de SRAG, segundo faixa etária e semana epidemiológica do início dos sintomas, de residentes do Distrito Federal. Distrito Federal, 2023 e 2024 até a SE 10.



Fonte: SIVEP Gripe, acesso em 11/03/2024. Sujeitos à alteração. SRAG: Síndrome Respiratória Aguda Grave.

3. Perfil dos casos de SRAG por Vírus Respiratórios

O presente tópico pretende detalhar os casos de SRAG por vírus respiratórios (SARS-CoV-2, Influenza e outros vírus respiratórios) em residentes do Distrito Federal em 2024.

Dos 626 casos de SRAG notificados em 2024, 222 (35,5%) foram por vírus respiratórios. Os casos de SRAG correspondem: 16,8% por SARS-CoV-2, 17,6% por outros vírus respiratórios e 1,1% por influenza. Foram identificados 71 (64,5%) vírus sincicial respiratório, 28 (25,5%) rinovírus, 6 (5,5%) metapneumovírus, 3 (2,7%) adenovírus e 2 (1,8%) parainfluenza 3. Ocorreu 1 óbito por influenza e 6 óbitos por SARS-CoV-2, sendo que 1 óbito ocorreu no Rio Grande do Norte em residente do Distrito Federal (Tabela 2).

Tabela 2. Distribuição dos casos e óbitos de SRAG, de acordo com a classificação final, de residentes do Distrito Federal. Distrito Federal, 2024 até a SE 10.

Etiologia da SRAG	Casos		Óbitos	
	n	%	n	%
SARS-CoV-2	105	16,8	6	31,6
Influenza	7	1,1	1	5,3
Outros vírus respiratórios	110	17,6	0	0,0
Outros agentes etiológicos	2	0,3	0	0,0
Não especificado	348	55,6	12	63,2
Em investigação	54	8,6	0	0,0
Total	626	100,0	19	100,0

Fonte: SIVEP Gripe, acesso em 11/03/2024. Sujeitos à alteração. SRAG: Síndrome Respiratória Aguda Grave.

Em relação aos dados sócio demográficos e clínicos observa-se que a maioria dos casos (50,5%) e óbitos (71,4%) por vírus respiratórios foi do sexo feminino.

A variável idade quanto aos casos apresenta média de 27 anos, mediana 2, com idade mínima de 0 e máxima de 93 anos. Em relação aos óbitos a idade média dos pacientes é de 51 anos, enquanto que a mediana é 59, com idade mínima de 0 e máxima de 80 anos.

Quanto à variável raça/cor dos casos positivos para vírus respiratórios, 22 (9,9%) não apresentavam informações, ou seja, foram tratados como ignorado. Em relação aos registros com informações válidas, a raça/cor parda apresenta maior proporção de registros com 142 (71,0%) casos e 3 (50,0%) óbitos.

Dos casos que evoluíram a óbito (7), 5 (71,4%) tinham algum fator de risco, sendo os mais frequentes: cardiopatia (42,9%) e maior de 60 anos (42,9%).

No que diz respeito ao uso de suporte ventilatório, um total de 222 (100,0%) casos de SRAG por vírus respiratórios apresenta informações válidas. Observa-se que a maioria dos casos (57,7%) utilizaram ventilação não invasiva. Entre os óbitos, 85,7% foram intubados. (Tabela 3).

Tabela 3. Dados sócio demográficos e clínicos casos e óbitos de SRAG por vírus respiratórios. Distrito Federal, 2024 até a SE 10.

Variável	SARS-CoV-2				Influenza				Outros vírus respiratórios				Total			
	Casos		Óbitos		Casos		Óbitos		Casos		Óbitos		Casos		Óbitos	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Sexo																
Feminino	55	52,4	5	83,3	2	28,6	0	0,0	55	50,0	0	0,0	112	50,5	5	71,4
Masculino	50	47,6	1	16,7	5	71,4	1	100,0	55	50,0	0	0,0	110	49,5	2	28,6
Total	105	100,0	6	100,0	7	100,0	1	100,0	110	100,0	0	0,0	222	100,0	7	100,0
Faixa etária (anos)																
Menor de 2	23	21,9	1	16,7	1	14,3	0	0,0	78	70,9	0	0,0	102	45,9	1	14,3
2 a 10	4	3,8	0	0,0	2	28,6	0	0,0	28	25,5	0	0,0	34	15,3	0	0,0
11 a 19	1	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,9	0	0,0	2	0,9	0	0,0
20 a 29	1	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,9	0	0,0	2	0,9	0	0,0
30 a 39	4	3,8	1	16,7	1	14,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	2,3	1	14,3
40 a 49	6	5,7	1	16,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	2,7	1	14,3
50 a 59	7	6,7	1	16,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	3,2	1	14,3
60 a 69	8	7,6	0	0,0	2	28,6	1	100,0	1	0,9	0	0,0	11	5,0	1	14,3
70 a 79	23	21,9	1	16,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	23	10,4	1	14,3
80 e mais	28	26,7	1	16,7	1	14,3	0	0,0	1	0,9	0	0,0	30	13,5	1	14,3
Total	105	100,0	6	100,0	7	100,0	1	100,0	110	100,0	0	0,0	222	100,0	7	100,0
Raça/Cor*																
Parda	60	65,2	2	40,0	4	57,1	1	100,0	78	77,2	0	0,0	142	71,0	3	50,0
Branca	27	29,3	3	60,0	3	42,9	0	0,0	20	19,8	0	0,0	50	25,0	3	50,0
Preta	3	3,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	3,0	0	0,0	6	3,0	0	0,0
Amarela	2	2,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	1,0	0	0,0
Indígena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	92	100,0	5	100,0	7	100,0	1	100,0	101	100,0	0	0,0	200	100,0	6	100,0
Fatores de risco**																
Maior de 60 anos	59	56,2	2	1,9	3	42,9	1	100,0	2	1,8	0	0,0	64	28,8	3	42,9
Doença cardiovascular	45	42,9	2	1,9	2	28,6	1	100,0	5	4,5	0	0,0	52	23,4	3	42,9
Diabetes	27	25,7	0	0,0	1	14,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	28	12,6	0	0,0
Pneumopatia	17	16,2	1	1,0	2	28,6	0	0,0	11	10,0	0	0,0	30	13,5	1	14,3
Obesidade	4	3,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	1,8	0	0,0
Doença renal	10	9,5	1	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	4,5	1	14,3
Doença neurológica	13	12,4	1	1,0	0	0,0	0	0,0	1	0,9	0	0,0	14	6,3	1	14,3
Imunodepressão	10	9,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,9	0	0,0	11	5,0	0	0,0
Doença hepática	2	1,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,9	0	0,0
Doença hematológica	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Gestante	1	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,9	0	0,0	2	0,9	0	0,0
Puérpera	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Menor de 2 anos	23	21,9	1	1,0	1	14,3	0	0,0	78	70,9	0	0,0	102	45,9	1	14,3
Síndrome de Down	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,9	0	0,0	1	0,5	0	0,0
Suporte ventilatório*																
Sim, invasivo	20	19,0	5	83,3	2	28,6	1	100,0	14	12,7	0	0,0	36	16,2	6	85,7
Sim, não invasivo	48	45,7	1	16,7	2	28,6	0	0,0	78	70,9	0	0,0	128	57,7	1	14,3
Não	37	35,2	0	0,0	3	42,9	0	0,0	18	16,4	0	0,0	58	26,1	0	0,0
Total	105	100,0	6	100,0	7	100,0	1	100,0	110	100,0	0	0,0	222	100,0	7	100,0

Fonte: SIVEP Gripe, acesso em 11/03/2024. Sujeitos à alteração. SRAG: Síndrome Respiratória Aguda Grave. *Foram considerados os pacientes com informações válidas em relação a raça/cor e ao uso de suporte ventilatório. **Um mesmo paciente pode apresentar múltiplos fatores de risco.

A Tabela 4 apresenta incidência e mortalidade por 100mil/habitantes dos casos de SRAG por vírus respiratórios. A maior incidência foi na faixa etária de indivíduos com 80 anos e mais para o vírus SARS-CoV-2 e influenza. Para os casos de outros vírus respiratórios, a incidência foi maior em menores de 2 anos **(Tabela 4)**.

Tabela 4. Incidência (100 mil hab.) e mortalidade (100 mil hab.) casos de SRAG por vírus respiratórios, segundo faixa etária (em anos). Distrito Federal, 2024 até a SE 10.

Faixa etária (anos)	Sars-Cov-2		Influenza		Outros vírus respiratórios		Total	
	Casos 100 mil/hab	Óbitos 100 mil/hab	Casos 100 mil/hab	Óbitos 100 mil/hab	Casos 100 mil/hab	Óbitos 100 mil/hab	Casos 100 mil/hab	Óbitos 100 mil/hab
Menor de 2	27,3	1,2	1,2	0,0	92,7	0,0	121,2	1,2
2 a 10	1,1	0,0	0,6	0,0	7,8	0,0	9,5	0,0
11 a 19	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	0,0
20 a 29	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0
30 a 39	0,8	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,9	0,2
40 a 49	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,2
50 a 59	1,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,3
60 a 69	3,3	0,0	0,8	0,4	0,4	0,0	4,5	0,4
70 a 79	18,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	0,8
80 e mais	52,3	1,9	1,9	0,0	1,9	0,0	56,0	1,9
Distrito Federal	3,3	0,2	0,2	0,0	3,4	0,0	6,9	0,2

Fonte: SIVEP Gripe, acesso em 11/03/2024. Sujeitos à alteração. População: IBGE e Codeplan projeção 2024. SRAG: Síndrome Respiratória Aguda Grave.

O tempo de evolução dos casos de SRAG por vírus respiratórios foi estimado considerando número de dias entre a data da internação e do desfecho (cura ou óbito). As medidas de tendência central e dispersão deste tempo, estratificadas por agentes etiológicos e evolução, estão apresentadas na **Tabela 5**.

Tabela 5. Tempo de evolução em dias dos casos de SRAG por vírus respiratórios, segundo etiologia e evolução* (cura ou óbito). Distrito Federal, 2024 até a SE 10.

Agente etiológico	n	Tempo em dias			
		Média	Mediana	Mínimo	Máximo
Cura					
SARS-CoV-2	59	11,1	7,0	1	57
Influenza	3	2,3	2,0	1	3
Outros vírus respiratórios	76	5,8	4,0	1	25
Total	138	8,0	4,0	1	57
Óbito					
SARS-CoV-2	5	6,8	6,0	2	12
Influenza	1	2,0	2,0	2	2
Outros vírus respiratórios	-	-	-	-	-
Total	6	6,0	6,0	2	12

Fonte: SIVEP Gripe, acesso em 11/03/2024. Sujeitos à alteração. SRAG: Síndrome Respiratória Aguda Grave. *Foram considerados os pacientes com informações válidas em relação à evolução (cura ou óbito).

As Regiões de Saúde Centro Sul (10,2) e Norte (0,5) apresentaram o maior número de casos e óbitos por 100 mil habitantes, respectivamente. Dentre as Regiões Administrativas, a maior incidência e taxa de mortalidade foram observadas no Lago Sul (19,6) e Jardim Botânico (1,6), respectivamente. (Tabela 6).

Tabela 6. Distribuição dos casos de SRAG por vírus respiratórios, segundo Região de Saúde e Região Administrativa em residentes do Distrito Federal. Distrito Federal, 2024 até a SE 10.

Região de Saúde/Região Administrativa	Casos	%	Casos por 100 mil hab.	Óbitos	%	Óbitos por 100 mil hab.
SUDOESTE	41	18,5	4,7	3	42,9	0,3
ÁGUAS CLARAS*	9	4,1	5,1	0	0,0	0,0
RECANTO DAS EMAS	9	4,1	6,2	0	0,0	0,0
SAMAMBAIA	8	3,6	3,1	0	0,0	0,0
TAGUATINGA	12	5,4	5,6	3	42,9	1,4
VICENTE PIRES	3	1,4	3,7	0	0,0	0,0
CENTRAL	35	15,8	8,5	0	0,0	0,0
PLANO PILOTO	20	9,0	8,1	0	0,0	0,0
SUDOESTE/OCTOGONAL	3	1,4	5,2	0	0,0	0,0
CRUZEIRO	1	0,5	3,3	0	0,0	0,0
LAGO NORTE	4	1,8	10,3	0	0,0	0,0
LAGO SUL	6	2,7	19,6	0	0,0	0,0
VARJÃO DO TORTO	1	0,5	10,9	0	0,0	0,0
CENTRO SUL	38	17,1	10,2	0	0,0	0,0
CANDANGOLÂNDIA	2	0,9	12,4	0	0,0	0,0
PARKWAY	1	0,5	4,2	0	0,0	0,0
GUARÁ	24	10,8	16,5	0	0,0	0,0
NÚCLEO BANDEIRANTE	2	0,9	8,1	0	0,0	0,0
RIACHO FUNDO I	4	1,8	8,7	0	0,0	0,0
RIACHO FUNDO II	2	0,9	2,6	0	0,0	0,0
SCIA (ESTRUTURAL)	3	1,4	7,6	0	0,0	0,0
S I A	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
NORTE	34	15,3	9,0	2	28,6	0,5
FERCAL*	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
PLANALTINA	16	7,2	7,5	1	14,3	0,5
SOBRADINHO*	13	5,9	15,3	1	14,3	1,2
SOBRADINHO II	5	2,3	6,2	0	0,0	0,0
SUL	14	6,3	5,0	1	14,3	0,4
GAMA	7	3,2	4,8	0	0,0	0,0
SANTA MARIA	7	3,2	5,3	1	14,3	0,8
OESTE	24	10,8	4,6	0	0,0	0,0
BRAZLÂNDIA	2	0,9	3,0	0	0,0	0,0
CEILÂNDIA*	22	9,9	4,8	0	0,0	0,0
LESTE	36	16,2	10,1	1	14,3	0,3
ITAPOÃ	10	4,5	11,0	0	0,0	0,0
PARANOÁ	10	4,5	13,1	0	0,0	0,0
SÃO SEBASTIÃO	10	4,5	7,8	0	0,0	0,0
JARDIM BOTÂNICO	6	2,7	9,6	1	14,3	1,6
DISTRITO FEDERAL	222	100,0	6,9	7	100,0	0,2

Fonte: SIVEP Gripe, acesso em 11/03/2024. Sujeitos à alteração. População: IBGE e Codeplan projeção 2024. *Os casos da RA Fercal estão contabilizados em Sobradinho, enquanto que os casos de Sol Nascente em Ceilândia e os casos de Arnieiras em Águas Claras. ** 0 caso e 0 óbito com RA de residência em investigação. SRAG: Síndrome Respiratória Aguda Grave.


4. Perfil das Hospitalizações por Covid-19

Com o intuito de traçar o perfil das hospitalizações por covid-19, serão apresentadas a seguir as análises dos casos hospitalizados (>24 horas) e óbitos que tiveram confirmação por covid-19 independentemente de terem apresentado sinais e sintomas que atendam aos critérios para SRAG notificados no SIVEP-Gripe em 2024.

Até a SE 10 (março) de 2024, foram notificados 212 casos hospitalizados por covid-19, destes 190 (89,6%) eram de residentes do Distrito Federal. A distribuição dos casos por semana epidemiológica demonstra um aumento das hospitalizações por covid-19 a partir da SE 05 (janeiro), atingindo o máximo na SE 08 com 36 notificações. Os maiores de 60 anos correspondem a 59,5% dos casos. (Figura 6)

Ocorreram 6 óbitos por SARS-CoV-2, sendo que 1 óbito ocorreu no Rio Grande do Norte em residente do Distrito Federal

Figura 6. Distribuição dos casos hospitalizados por covid-19, segundo faixa etária e semana epidemiológica do início dos sintomas, de residentes do Distrito Federal. Distrito Federal, 2024 até a SE 10.



Fonte: SIVEP Gripe, acesso em 11/03/2024. Sujeitos à alteração.

Os dados sócio demográficos e clínicos demonstram que a maioria dos casos (52,1%) e óbitos (83,3%) é do sexo feminino. Em relação aos casos, a variável idade apresenta média de 56 anos, mediana 69, com idade mínima de 0 e máxima de 100 anos. O maior número de casos e óbitos por 100 mil habitantes foi na faixa etária de 80 anos ou mais.

Dos registros com informações válidas, 100 (66,7%) casos estavam declarados como raça/cor parda.

Entre os casos, os sintomas mais frequentes foram tosse (61,6%), febre (57,4%) e saturação < 95% (49,5%). Entre os óbitos, foram saturação < 95% (100,0%), desconforto respiratório (100,0%) e dispneia (100,0%). Ressalta-se que variáveis relativas aos sinais e sintomas apresentaram uma média de 20% de ignorados ou em branco.

Observou-se que 133 (70,0%) casos tinham pelo menos um fator de risco relatado. Os fatores de risco identificados mais frequentes para casos foram: idade maior de 60 anos (59,5%), doença cardiovascular (42,6%) e diabetes (26,3%), já entre os óbitos foram doença cardiovascular (33,3%), maior de 60 anos (33,3%) (Tabela 7). Ressalta-se que variáveis relativas aos fatores de risco apresentaram uma média de 40% de dados ignorados ou em branco.

Tabela 7. Dados sócio demográficos e clínicos dos casos de hospitalizações e óbitos por covid-19 notificados no SIVEP-Gripe. Distrito Federal, 2024 até a SE 10.

Variável	Casos (N=190)			Óbitos (N=6)		
	n	%	Casos/100 mil hab.	n	%	Óbitos/100 mil hab.
Sexo						
Feminino	99	52,1	6,0	5	83,3	0,3
Masculino	91	47,9	5,9	1	16,7	0,1
Faixa etária (anos)						
Menor de 2	31	16,3	36,8	1	16,7	1,2
2 a 10	7	3,7	2,0	0	0,0	0,0
11 a 19	2	1,1	0,5	0	0,0	0,0
20 a 29	2	1,1	0,4	0	0,0	0,0
30 a 39	8	4,2	1,5	1	16,7	0,2
40 a 49	10	5,3	1,9	1	16,7	0,2
50 a 59	17	8,9	4,5	1	16,7	0,3
60 a 69	21	11,1	8,5	0	0,0	0,0
70 a 79	35	18,4	27,6	1	16,7	0,8
80 e mais	57	30,0	106,5	1	16,7	1,9
Raça/cor*						
Parda	100	66,7		2	40,0	
Branca	44	29,3		3	60,0	
Preta	4	2,7		0	0,0	
Amarela	2	1,3		0	0,0	
Indígena	0	0,0		0	0,0	
Sinais e sintomas**						
Dispneia	89	46,8		6	100,0	
Tosse	117	61,6		2	33,3	
Febre	109	57,4		3	50,0	
Saturação < 95%	94	49,5		6	100,0	
Desconforto respiratório	89	46,8		6	100,0	
Diarreia	24	12,6		0	0,0	
Dor de garganta	23	12,1		0	0,0	
Vômitos	35	18,4		1	16,7	
Perda do olfato	4	2,1		0	0,0	
Perda do paladar	3	1,6		0	0,0	
Dor abdominal	20	10,5		1	16,7	
Fadiga	33	17,4		2	33,3	
Fatores de risco**						
Maior de 60 anos	113	59,5		2	33,3	
Doença cardiovascular	81	42,6		2	33,3	
Diabetes	50	26,3		0	0,0	
Pneumopatia	21	11,1		1	16,7	
Obesidade	4	2,1		0	0,0	
Doença renal	19	10,0		1	16,7	
Doença neurológica	24	12,6		1	16,7	
Imunodepressão	17	8,9		0	0,0	
Doença hepática	2	1,1		0	0,0	
Doença hematológica	6	3,2		0	0,0	
Gestante	1	0,5		0	0,0	
Puérpera	0	0,0		0	0,0	
Síndrome de Down	2	1,1		0	0,0	

Fonte: SIVEP Gripe, acesso em 11/03/2024. Sujeitos à alteração. População: IBGE e Codeplan projeção 2024. *Foram considerados os pacientes com informações válidas em relação a raça/cor. **Um mesmo paciente pode apresentar múltiplos sintomas e fatores de risco.

Considerações

No período de 2020 a 2023, o SARS-CoV-2 foi o principal agente etiológico para a maioria dos casos e óbitos de SRAG por vírus respiratórios quanto no âmbito da vigilância sentinela de síndrome gripal do Distrito Federal. As medidas de distanciamento e isolamento sociais implementadas, principalmente no início da pandemia, possivelmente implicaram na redução da circulação dos demais vírus respiratórios. A incidência e a taxa de mortalidade de SRAG por covid-19 em indivíduos com 80 anos ou mais foi superior às demais faixas etárias. A maioria dos casos que evoluíram para óbito tinha ao menos um fator de risco. Observou-se um tempo maior de evolução para os casos de SRAG por SARS-CoV-2 em relação aos demais vírus respiratórios.

Em 2023, o vírus SARS-CoV-2 predominou nas unidades sentinelas e o VSR foi o vírus respiratório em destaque nos casos de SRAG, mas com aumento de casos por SARS-CoV-2 nas últimas semanas. Também nota-se a circulação de influenza. Importante frisar a necessidade de manter as medidas preventivas não farmacológicas, bem como uso oportuno de antiviral e atenção para os sinais de agravamento, além da vacinação de grupos prioritários contra a influenza e a covid-19.

A vacinação contra a covid-19 iniciou de forma gradual no Distrito Federal em janeiro de 2021 pelos grupos prioritários. No momento, está sendo disponibilizada vacinação para a população a partir de 6 meses de idade. A vacinação com a Pfizer bivalente é para toda a população acima de 18 anos que já completou o primeiro esquema vacinal.

Em maio de 2023, o Ministério da Saúde substituiu o kit quadriplex pelo kit triplex o qual possibilita a pesquisa de três agentes: SARS-CoV-2, influenza A e influenza B. O LACEN DF adicionou a pesquisa do VSR ao triplex. O LACEN DF tem realizado o painel viral ampliado (SARS-CoV-2, influenza A e influenza B, VSR, rinovírus e adenovírus) para as amostras coletadas nas unidades sentinelas, casos e óbitos por SRAG.

Recomendações

Medidas de prevenção gerais

- Vacinação anual contra a influenza, uma vez que a vacina é a intervenção mais importante para evitar casos graves e mortes pela doença.
- Intensificar a vacinação contra a covid-19.
- Intensificar as medidas que evitam a transmissão da gripe e outras doenças respiratórias, como:
 - Lavar e higienizar frequentemente as mãos, principalmente antes de consumir algum alimento e após tossir ou espirrar.
 - Utilizar lenço descartável para higiene nasal.
 - Cobrir o nariz e a boca, quando espirrar ou tossir.
 - Evitar tocar mucosas dos olhos, do nariz e da boca.
 - Evitar compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas.
 - Manter os ambientes bem ventilados.
 - Evitar aglomerações e ambientes fechados.
 - Uso de máscara, para controle da disseminação dos vírus respiratórios, por sintomáticos respiratórios, pessoas que tenham tido contato com pessoas com doenças respiratórias ou aquelas que possuem diagnóstico laboratorial positivo para covid-19 (teste de antígeno ou biologia molecular), inclusive assintomáticas.
 - Evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas de gripe.
 - Evitar sair de casa e o contato com pessoas de risco, se testar positivo para covid-19. Manter isolamento domiciliar por 7 dias após o início dos sintomas, desde que nas últimas 24h já esteja sem febre (sem o uso de antitérmicos) e com remissão dos sintomas. Caso ainda esteja com febre e/ou sem remissão dos sintomas no 7º dia, estender o isolamento até o 10º dia, desde que nas últimas 24h já esteja sem febre (sem o uso de antitérmicos) e com remissão dos sintomas.
 - Adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos.

Aos Profissionais de saúde

- Atentar para os sinais de agravamento (piora do quadro clínico) como a persistência ou aumento da febre por mais de três dias, aparecimento de dispneia ou taquipneia, confusão mental, desidratação, entre outros. Orientar o retorno à unidade de saúde nesses casos.
- Iniciar o uso do antiviral (Oseltamivir), o mais precocemente possível, preferencialmente nas primeiras 48 horas de início dos sintomas, em todos os casos de síndrome gripal que tenham condições e fatores de risco para complicações, independentemente da situação vacinal, mesmo em atendimento ambulatorial.
<https://www.saude.df.gov.br/medicamentos-influenza-oseltamivir/>
- Iniciar o uso do antiviral NMV/r (Nirmatrelvir + Ritonavir) dentro do prazo de 5 dias a partir de início dos sintomas, para os casos confirmados laboratorialmente para covid-19. Medicação destinada aos indivíduos imunossuprimidos com idade maior ou igual a 18 anos OU indivíduos com idade maior ou igual a 65 anos, independente do status vacinal, que apresentem quadro leve a moderado (não graves) que não requeiram o uso de oxigênio suplementar.
https://www.saude.df.gov.br/documents/37101/0/SEI_GDF+-+100191429+-+Nota+T%C3%A9cnica+-+uso+do+medicamento+NIRMATRELVIR+%2B+RITONAVIR.pdf/0be3dfb5-8cab-8cae-bfcf-35c5b32e19cd?t=1695902312298

Às unidades de saúde

- Realizar a coleta adequada de amostra clínica de todos os casos de SRAG que atendam a definição de caso, observando a oportunidade (entre o 3º e 7º dia de início de sintomas) e a qualidade da coleta.
- Notificar no SIVEP-Gripe todos os casos suspeitos ou confirmados de covid-19 ou SRAG hospitalizados (mínimo de 24 horas de permanência na instituição).
- Notificar no SIVEP-Gripe todos os óbitos suspeitos ou confirmados de covid-19, mesmo que não atendam definição de caso de SRAG, independente de hospitalização.
- Unidades Sentinelas de SG: atentar para a coleta de até vinte amostras/semana de RT-PCR e cadastro das amostras no GAL/TrakCare com solicitação de painel de vírus respiratórios. As demais amostras coletadas na unidade, devem ser inseridas no sistema e-SUS notifica. O número insatisfatório prejudica a análise epidemiológica dos vírus em circulação, bem como a coleta acima desse quantitativo gera gasto excessivo de insumos e sobrecarga ao LACEN.

À Vigilância Epidemiológica

- Disseminar, nos serviços de saúde públicos e privados, o Guia de manejo e tratamento de influenza 2023, com ênfase no tratamento oportuno dos casos de SRAG e de SG com condições e fatores de risco.
- Acompanhar os casos de SRAG notificados no SIVEP-Gripe, de sua unidade, quanto ao encerramento oportuno e qualificação dos dados.
- Acompanhar o indicador de coleta de amostras nas unidades sentinelas da região de Saúde.

Para maiores informações acesse:

- Informes epidemiológicos de influenza no Distrito Federal: <https://www.saude.df.gov.br/gripe-1>
- Informes epidemiológicos de covid-19 no Distrito Federal: <https://www.saude.df.gov.br/boletinsinformativos-divep-cieves>
- Portal covid-19 no Distrito Federal: <http://www.coronavirus.df.gov.br/>
- Plano de Contingência do Distrito Federal para Infecção Humana pelo novo Coronavírus versão 7, julho de 2021: https://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/Plano_de_contingencia_COVID_7-publicar1.pdf
- Informes epidemiológicos de influenza no site da SVS do Ministério da Saúde: <http://saude.gov.br/saude-de-a-z/gripe>
- Guia de manejo e tratamento de influenza 2023: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/influenza/guia-de-manejo-e-tratamento-de-influenza-2023>
- Curso de atualização para manejo clínico de influenza: <https://www.unasus.gov.br/cursos/oferta/417095>
- Dados de atendimentos de síndrome gripal das unidades básicas de saúde que são sentinelas de síndrome gripal: <https://info.saude.df.gov.br/atendimento-individual-gripal-sentinelas-salasit-aba-aps/>
- Cartaz de classificação de risco e manejo do paciente com síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave: <http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/abril/27/cartaz-sindrome-gripal-2018.pdf>
- Guia para a rede laboratorial de vigilância de influenza no Brasil – 2016: http://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_laboratorial_influenza_vigilancia_influenza_brasil.pdf
- Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019, Atualizado em 20/01/2022: <https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/guia-de-vigilancia-epidemiologica-covid-19/view>
- Guia de Vigilância Genômica do SARS-CoV-2. Uma abordagem epidemiológica e laboratorial: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_genomica_sarscov2.pdf
- Guia de vigilância em saúde: volume 3 (6ª edição): <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-3-6a-edicao/view>

**Subsecretaria de Vigilância à Saúde – SVS**

Fabiano dos Anjos Pereira Martins – Subsecretário

Diretoria de Vigilância Epidemiológica – DIVEP

Juliane Maria Alves Siqueira Malta - Diretora

Elaboração (em ordem alfabética):

Cleidiane Santos Rodrigues de Carvalho – Enfermeira – Área Técnica da Vigilância Epidemiológica da Influenza e outros vírus respiratórios

Rosana Aparecida Campos Coelho – Enfermeira – Área Técnica da Vigilância Epidemiológica da Influenza e outros vírus respiratórios

Tatyane de Souza Cardoso Quintão – Farmacêutica – Área Técnica da Vigilância Epidemiológica da Influenza e outros vírus respiratórios

Revisão e colaboração (em ordem alfabética):

Renata Brandão Abud – Gerente GEVITHA

Endereço:

SEPS 712/912 – Bloco D – Brasília/DF

CEP: 70.390-125

E-mail: gripedf@saude.df.gov.br