



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DE HIDRADENITE SUPURATIVA

Portaria Conjunta nº 14, de 11 de setembro de 2019.

Paciente: _____

MONITORAMENTO APÓS INÍCIO DE TERAPIA COM ADALIMUMABE

Hidradenitis Suppurativa Clinical Response (HiSCR):

Esta ferramenta avalia a gravidade da doença e permite definir um alvo terapêutico.

É definida pelos três tipos de lesões:

1. Abscesso: flutuante, com ou sem drenagem, sensível ou doloroso;
2. Nódulos inflamatórios: doloroso, eritematoso, granuloma piogênico;
3. Fístula de drenagem: tratos sinusais com comunicação na derme, drenando secreção purulenta.

Início do tratamento: _____

Resposta ao tratamento:

() Redução de no mínimo 50% no quantitativo de abscessos e nódulos inflamatórios, sem aumento do número de abscessos e fístulas.

() Redução de 25% a 49% no quantitativo de abscessos e nódulos inflamatórios, sem aumento do número de abscessos e fístulas.

() Redução menor que 25% no quantitativo de abscessos e nódulos inflamatórios, sem aumento do número de abscessos e fístulas.

Outras informações pertinentes:

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura e carimbo do médico dermatologista