



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E EXAMES PARA SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO(S)



INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COM FRAÇÃO DE EJEÇÃO REDUZIDA – CID-10: I50.0, I50.1 e I50.9

MEDICAMENTOS

- Sacubitril Valsartana Sódica Hidratada 100 Mg Comp;
- Sacubitril Valsartana Sódica Hidratada 200 Mg Comp;
- Sacubitril Valsartana Sódica Hidratada 50 Mg Comp;
- Dapagliflozina 10 Mg Comp;

DOCUMENTOS PESSOAIS A SEREM APRESENTADOS

- Cópia da Carteira de Identidade (ou Documento de Identificação com foto) e CPF
- Cópia do Cartão Nacional de Saúde (CNS)
- Cópia do Comprovante de Residência

DOCUMENTOS A SEREM EMITIDOS PELO MÉDICO

PRIMEIRA SOLICITAÇÃO

- **LME** – Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos (Modelo anexo)
- **Prescrição Médica**
- **Relatório Médico** com a classificação funcional da Insuficiência cardíaca do paciente conforme a classificação da New York Heart Association (NYHA); com sinais/sintomas clínicos e histórico de internações por insuficiência cardíaca descompensada; com uso prévio de medicamentos utilizados para tratar a condição clínica e doses máximas utilizadas;
- **Relatório Padronizado Insuficiência Cardíaca** (Anexo I) constando: com uso prévio de medicamentos utilizados para tratar a condição clínica e doses máximas utilizadas.

EXAMES A SEREM APRESENTADOS

PRIMEIRA SOLICITAÇÃO: EXAMES GERAIS

Para Sacubitril Valsartana:

- Cópia do exame de dosagem sérica do peptídeo natriurético de tipo B (BNP) OU;
- Cópia do exame de dosagem sérica de N-terminal pró-peptídeo natriurético de tipo B (NT-proBNP); E
- Cópia do laudo da ecocardiografia (o último realizado).

Para Dapagliflozina:

- Cópia do laudo da Ecocardiografia (o último realizado).

OBSERVAÇÕES

- Para Sacubitril Valsartana e Dapagliflozina a indicação é para tratamento de pacientes maiores de 18 anos.
- Conforme orientação do fabricante, não é possível a utilização de composição de dose para o medicamento Sacubitril Valsartana, uma vez que os comprimidos não são equivalentes. Exemplo: 30 comprimidos de 100 mg não é equivalente a 60 comprimidos de 50 mg de Sacubitril Valsartana.

