

Justificativa para opção terapêutica e tempo de uso- ARTRITE PSORIÁSICA (campo obrigatório):

() Espandiloartrite axial

Primeiro AINE
(dose): _____

Segundo AINE
(dose): _____

() *Falha a 2 AINEs com uso dos mesmos por 3 meses no total ou () contra-indicação

Justificar: _____

***Falha: BSADAI > 4 e dor na coluna com Escala visual > 4 (0-10) e/ou ASDAS ≥ 2,1 após 6 meses de uso de forma isolada ou combinada a AINEs ou MMCD-s**

() Espandiloartrite Periférica

Primeiro AINE (dose): _____ + Segundo AINE (dose): _____

() Falha a 2 AINEs ou glicocorticóides com uso dos mesmos por 3 meses no total ou () contra-indicação

Troca para MMCD sintéticos

() Sulfassalazina () Metotrexato
() Ciclosporina () Leflunomida

(dose): _____

() **Falha : ≥ 1 articulações inflamadas, entesite ou dactilite ou não atingir 5 dos 7 critérios do MDA com o medicamento de forma isolada ou em associação por 6 meses ou () contra-indicação

Justificar: _____

() Dactilite

Troca para MMCD sintéticos

() Sulfassalazina () Metotrexato
() Ciclosporina () Leflunomida

(dose): _____

() **Falha : ≥ 1 articulações inflamadas, entesite ou dactilite ou não atingir 5 dos 7 critérios do MDA com o medicamento de forma isolada ou em associação por 6 meses ou () contra-indicação

Justificar: _____

() Entesite

Troca para MMCD sintéticos

() Sulfassalazina () Metotrexato
() Ciclosporina () Leflunomida

(dose): _____

() **Falha : ≥ 1 articulações inflamadas, entesite ou dactilite ou não atingir 5 dos 7 critérios do MDA com o medicamento de forma isolada ou em associação por 6 meses ou () contra-indicação

Justificar: _____

- 1º MMCD biológico anti-TNF ou *anti-IL17: () adalimumabe () etanercepte () infliximabe () Golimumabe () *Secuquinumabe
() Falha * ou ** ao anti-TNF após 3 meses de uso de forma isolada ou combinada ou () contra-indicação
- 2º MMCD biológico: anti-TNF ou *anti-IL17: () adalimumabe () etanercepte () infliximabe () Golimumabe () *Secuquinumabe
() Falha * ou ** aos anti-TNF ou ao anti-IL-17 após 6 meses de uso de forma isolada ou combinada ou () contra-indicação
- 3º MMCD biológico: anti-TNF ou ao *anti-IL17: () adalimumabe () etanercepte () infliximabe () Golimumabe () *Secuquinumabe
() Falha * ou ** aos anti-TNF ou ao anti-IL-17 após 6 meses de uso de forma isolada ou combinada ou () contra-indicação
- OUTRO 4º ESQUEMA, DESCREVER: _____

DATA: _____