

O QUE É PrEP (PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO)?

A profilaxia pré-exposição (PrEP) ao HIV consiste no uso de antirretrovirais (ARV) orais para reduzir o risco de adquirir a infecção pelo HIV. Essa estratégia se mostrou eficaz e segura em pessoas com risco aumentado de adquirir a infecção.



CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO



- Idade \geq 15 anos e peso \geq 35 kg, com vida sexual ativa; **E**
- Relações sexuais anais ou vaginais com penetração sem o uso de preservativo; **E/OU**
- Relações sexuais com parcerias eventuais; **E/OU**
- Quantidade e diversidade de parcerias sexuais; **E/OU**
- Histórico de episódios de IST; **E/OU**
- Busca repetida por PEP; **E/OU**
- Contextos de relações sexuais em troca de dinheiro, objetos de valor, drogas, moradia etc.; **E/OU**
- Chemsex: prática sexual sob a influência de drogas psicoativas com a finalidade de melhorar ou facilitar as experiências sexuais.

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO



- Pacientes com HIV/aids;
- Pacientes com Doença renal crônica, que é caracterizada pela eTFG (Taxa de filtração glomerular) $<$ 60;
 - Para calcular a taxa de filtração glomerular do paciente, use a calculadora disponível no link abaixo, da Sociedade Brasileira de Nefrologia:

<https://sbn.org.br/medicos/utilidades/calculadoras-nefrologicas/ckdepi/>



PROFISSIONAIS PRESCRITORES

- Na APS e na AAE da SES-DF: médicos, enfermeiros e farmacêuticos**;
- No sistema privado: médicos.

EXAMES NECESSÁRIOS

- Teste rápido de HIV;
- Testes rápidos de Hepatites B e C e Sífilis;
- Creatinina e cálculo da eTFG ([calcule a eTFG aqui](#));
- Avaliar histórico e risco de fratura patológica*;
- Teste de gravidez (se potencial reprodutivo).



GUIA DE PRESCRIÇÃO

Apresentação:

- Tenofovir + Entricitabina (TDF/FTC) 300 + 200 mg

Posologia:

- Uso diário: Iniciar com "dose de ataque" de 2 comprimidos no 1º dia, seguidos de 1 comprimido 1x/dia em uso contínuo.
- Uso sob demanda***: 2 + 1 + 1 (2 comprimidos de 24h a 2h antes da relação sexual + 1 comprimido 24h e 48h depois dos 2 primeiros comprimidos).

Como/onde prescrever:

SICLOM


- [Formulário \(editável\) de cadastramento de usuário de PrEP](#)
- [Ficha \(editável\) de atendimento para PrEP](#)



Validade:

No atendimento inicial a prescrição deve ser realizada para apenas 30 dias. No retorno em até 30 dias avaliam-se a ocorrência de efeitos adversos, a adesão e o eTFG e repetem-se os testes rápidos. A partir de então recomenda-se o acompanhamento trimestral, podendo a prescrição ser emitida para até 120 dias.

PrEP SOB DEMANDA



PrEP de USO DIÁRIO

1 cp Todos os dias.

COMO RETIRAR O MEDICAMENTO?

Apresentação:

- Para retirar a PrEP em qualquer uma das unidades dispensadoras, o usuário precisa apresentar:
 - Documento de identificação;
 - Prescrição no formulário do SICLOM;
 - Laudo de teste rápido* de HIV realizado no mesmo dia, com resultado não reagente, ou um laudo de sorologia para o HIV realizado nos últimos 7 dias, com resultado não reagente.

*O laudo de teste rápido de HIV pode ser impresso no e-SUS ou confeccionado à mão, com data, assinatura e carimbo do profissional que laudou o exame.

PARA SABER QUAIS SÃO AS UNIDADES DISPENSADORAS USE O LINK ABAIXO:

https://www.saude.df.gov.br/documentos/37101/O/Anexos_NT_PEP+A_tualizado.pdf/



*Embora o Tenofovir seja conhecido por diminuir a massa óssea quando usado para o tratamento ou prevenção da infecção pelo HIV, tal significado clínico é incerto. Não está indicada a realização rotineira de densitometria óssea ou outra avaliação de massa óssea antes do início de PrEP ou seu monitoramento. Entretanto, recomenda-se que os candidatos à PrEP com histórico de fratura óssea por fragilidade patológica ou fatores de risco significativos para osteoporose sejam encaminhados para avaliação e acompanhamento médico e laboratorial específico, não sendo este um motivo para atrasar o início da PrEP.

**A Nota Técnica Nº 3/2023 SES/SULOG/DIASF/GCBAF (129771262) e o [Ofício Circular Nº 11/2022/CGAHV/DCCI/SVS/MS](#) normatizam o atendimento para avaliação, prescrição e seguimento de PrEP e PEP por profissionais farmacêuticos.

**A modalidade sob demanda é contraindicada para mulheres cisgênero, bem como para homens transgênero ou pessoas não binárias em uso de terapia hormonal contendo estradiol, devido à interação do hormônio com a PrEP, que retarda o início de sua efetividade. Por esse mesmo motivo, a proteção da PrEP nessas pessoas só começa 7 dias após seu início.