



# RELATÓRIO PADRONIZADO – DOENÇA DE ALZHEIMER – PORTARIA CONJUNTA Nº 13, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017



O(A) Sr(a) \_\_\_\_\_,  
está em acompanhamento regular em consultório médico e é portadora (a) de:

- G30.0 Doença de Alzheimer de início precoce
- G30.1 Doença de Alzheimer de início tardio
- G30.8 Outras formas de doença de Alzheimer
- F00.0 Demência na doença de Alzheimer de início precoce
- F00.1 Demência na doença de Alzheimer de início tardio
- F00.2 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista

## 1) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

Relatório médico com descrição da apresentação da doença, evolução, sintomas neuropsiquiátricos apresentados, medicamentos já prescritos, com suas respectivas posologias, e comorbidades relevantes:

---

---

---

---

---

---

---

---

## 2) MEDICAMENTOS PRESCRITOS

- |  |   |
|--|---|
| <input type="radio"/> Donepezila Comp 5 mg                     | <input type="radio"/> Rivastigmina 1,5 Mg Cap                 |
| <input type="radio"/> Donepezila Comp 10 mg                    | <input type="radio"/> Rivastigmina 3 Mg Cap                   |
| <input type="radio"/> Galantamina 16 mg Cap De Lib Prol        | <input type="radio"/> Rivastigmina 4,5 mg                     |
| <input type="radio"/> Galantamina 24 mg Cap De Lib             | <input type="radio"/> Rivastigmina 6 mg Cap                   |
| <input type="radio"/> Galantamina 8 Mg Cap De Lib Prol         | <input type="radio"/> Rivastigmina 9 mg Adesivo Transdérmico  |
| <input type="radio"/> Memantina, Cloridrato 10 Mg Cap Lib Prol | <input type="radio"/> Rivastigmina 18 mg Adesivo Transdérmico |

## 3) CRITÉRIOS DO PCDT/MS:

### A) Para inibidores da acetilcolinesterase (Donepezila, Galantamina ou Rivastigmina):

Serão incluídos os pacientes que preencherem todos os critérios abaixo:

- Diagnóstico de DA provável, segundo os critérios do NIA-AA e ABN;
- MEEM com escore entre 12 e 24 para pacientes com mais de 4 anos de escolaridade ou entre 8 e 21 para pacientes com até 4 anos de escolaridade;
- Escala CDR = 1 ou 2 (demência leve ou moderada);
- TC ou RM do encéfalo e exames laboratoriais que afastem outras doenças frequentes nos idosos que possam provocar disfunção cognitiva (detalhados acima);

### B) Para Memantina:

#### B.1) Combinada aos inibidores da acetilcolinesterase:

Serão incluídos os pacientes que preencherem todos os critérios abaixo:

- Diagnóstico de DA provável, segundo os critérios do NIA-AA, ABN;
- TC ou RM do encéfalo e exames laboratoriais que afastem outras doenças frequentes nos idosos que possam provocar disfunção cognitiva (detalhados acima)
- Escore na escala CDR= 2 (demência moderada);
- Escores no MEEM entre 12 e 19, se escolaridade maior que 4 anos, ou entre 8 e 15, se escolaridade menor ou igual a 4 anos

**B.2) Em Monoterapia:**

Serão incluídos os pacientes que preencherem todos os critérios abaixo:

- Diagnóstico de DA provável, segundo os critérios do NIA-AA, ABN;
- TC ou RM do encéfalo e exames laboratoriais que afastem outras doenças frequentes nos idosos que possam provocar disfunção cognitiva (detalhados acima);
- Escore na escala CDR=3 (demência grave);
- MEEM com escore entre 5 e 11, para escolaridade maior que 4 anos, ou entre 3 e 7, quando escolaridade menor ou igual a 4 anos.

**DATA:** \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

---

**ASSINATURA DO MÉDICO ASSISTENTE E CARIMBO**