




FUNCHO

Foeniculum vulgare Mill¹.



Felipe Lipparelli Scafuto Tironi

1. APRESENTAÇÕES PADRONIZADAS E ACESSO²

33426 FUNCHO (FOENICULUM VULGARE) TINTURA FRASCO 30ML – FITOTERÁPICO – UBS – Unidades de Referência.

2. CLASSE TERAPÊUTICA²

MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS OU FITOTERÁPICOS (Manipulado pela SES-DF)

3. INDICAÇÕES³

Como ajuvante no tratamento dos sintomas de desconfortos gastrintestinais leves, como cólicas, distensão abdominal e flatulência

3.1 PROTOCOLO SES

Protocolo de Acesso às Plantas Medicinais e Fitoterápicos na SES-DF (Em elaboração).

3.2 PROTOCOLO MS

Não se aplica

4. CONTRAINDICAÇÕES³

Este medicamento é contraindicado para Gestantes, mulheres com hipermenorreia, casos de hiperestrogenismo, pessoas com hipersensibilidade as espécies da família Apiaceae e/ou aos componentes da formulação.

Além dessas, também são contraindicadas para pessoas com histórico de convulsões. O uso prolongado sem acompanhamento médico.

5. ADMINISTRAÇÃO E USO³

5.1 VIA DE ADMINISTRAÇÃO

Via Oral

5.2 MODO DE USO

Uso adulto: Agitar o frasco e pingar de 20 a 50 gotas (1 a 3ML) da tintura em um copo com 50ML de água três vezes ao dia.

5.3 CARACTERÍSTICAS DA FORMULAÇÃO

5.3.1 DISSOLUÇÃO (QUANDO APLICÁVEL) OU COMPATIBILIDADE (QUANDO APLICÁVEL)

Não se aplica.

5.3.2 TECNOLOGIAS DA FORMA FARMACÊUTICA (QUANDO APLICÁVEL)

Não se aplica.

5.3.3 PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS E ORGANOLÉPICAS

Mistura heterogênea que pode apresentar precipitação. Agitar antes de usar

Fórmula: Tintura a 10% obtida a partir da percolação das folhas secas de *Foeniculum vulgare* Miller (10g) em álcool de cereais 70 °GL (q.s.p. 100mL).

5.4 DOSAGENS

5.4.1 DOSE MÁXIMA

Não utilizar em doses acima das recomendadas.

5.4.2 TITULAÇÃO DE DOSE E DESMAME (QUANDO APLICÁVEL)

Não se aplica

5.5 RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

É contraindicado o uso prolongado, a não ser com estrito acompanhamento médico, e para pessoas com refluxo.

6. FARMACOLOGIA CLINICAMENTE RELEVANTE³

6.1 FARMACODINÂMICA

6.1.1 MECANISMO DE AÇÃO

Não se aplica.

6.1.2 INÍCIO DA AÇÃO

Não se aplica

6.2 FARMACOCINÉTICA

6.2.1 ABSORÇÃO

- BIODISPONIBILIDADE

Não se aplica.

- PICO DE CONCENTRAÇÃO PLASMÁTICA

Não se aplica

6.2.2 DISTRIBUIÇÃO

- LIGAÇÃO A PROTEÍNAS PLASMÁTICAS

Não se aplica.

- SOLUBILIDADE

Não se aplica

6.2.3 METABOLISMO

Não se aplica.

6.2.4 ELIMINAÇÃO

- MEIA-VIDA DE ELIMINAÇÃO

Não se aplica.

7. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS⁴

7.1 INTERAÇÃO MEDICAMENTO X MEDICAMENTO

Um estudo sugere que o funcho pode inibir a enzima do Citocromo P450 3A4.

7.2 INTERAÇÃO MEDICAMENTO X ALIMENTO

Não se aplica.

7.3 INTERAÇÃO MEDICAMENTO X EXAMES LABORATORIAIS

Não se aplica.

8. EFEITOS ADVERSOS³

8.1 GRAVES

Este medicamento pode causar hiperpigmentação cutânea na exposição excessiva ao sol. Além desses, também são relatados Redução do limiar convulsivo no uso do anetol e da miristina em doses elevadas..

8.2 COMUNS

Este medicamento pode causar Não se aplica. Além desses, também são relatados Não se aplica.

9. AJUSTES DE DOSE³

9.1. INJURIA RENAL

9.1.1 ADULTO

Não se aplica.

9.1.2 CRIANÇA E NEONATO

Não se aplica.

9.1.3 HEMODIÁLISE

Não se aplica.

9.2. INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA

9.2.1 ADULTO

Não se aplica.

9.2.2 CRIANÇA E NEONATO

Não se aplica.

10. PRECAUÇÕES³

10.1 CUIDADOS NA GRAVIDEZ

Contraindicado durante a gestação.

10.2 CUIDADOS NA AMAMENTAÇÃO

Não se aplica.

10.3 CUIDADOS NA CRIANÇA

Não se aplica.

10.4 CUIDADOS NO IDOSO

Não se aplica.

11. CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO³

Devem ser armazenados a temperatura ambiente protegidos do sol em local seco

12. PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO⁵

12.1 PRESCRIÇÃO

12.1.1 RECEITUÁRIO

Receita simples

12.1.2 QUANTIDADE POR RECEITA

Não se aplica

12.1.3 LIMITE POR PRESCRIÇÃO

Não se aplica.

12.1.4 VALIDADE

Não se aplica

12.2 DISPENSAÇÃO

UBS – Unidade de Referência.

13. ORIENTAÇÕES AO PACIENTE⁵

Agite antes de usar. Conr

14. ORIENTAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE³

O uso prolongado deve ser acompanhado pelo profissional médico. Não deve ser utilizado em pessoas com histórico de convulsões.

15. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1 Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. [05 abr. 2021]. Available from: <http://www.tropicos.org>.

2 Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Relação de Medicamentos Padronizados - REME/DF - versão para profissionais de saúde [Internet]. Brasília: [citado em 22 Mar. 2021]. Disponível em: <http://www.saude.df.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/REME-COMPLETA-PROF-16.03.21.pdf>.

3 Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL). Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. – 2. ed. Brasília, DF: Anvisa, 2021. Brasília: [citado em 05 abr. 2021] Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/farmacopeia/formulario-fitoterapico/arquivos/2021-fffb2-final-c-capa2.pdf>.

4 Subehan, Syed F. H. Zaidi, Shigetoshi K., Yasuhiro T. Inhibition on Human Liver Cytochrome P450 3A4 by Constituents of Fennel (*Foeniculum vulgare*): Identification and Characterization of a Mechanism-Based Inactivator. Japão. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2007.

5 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Fitoterápicos officinais: Guia de orientação a profissionais de saúde. 8 ed., Distrito Federal, 2018.

	Nome	Matrícula	Data
Elaboração	«Felipe Lipparelli Scafuto Tironi»	«Farmacêutico»	«05/04/2021»
Revisão	«Fernanda Alves França»	« Farmacêutico »	«25/05/2021»
Aprovação	«Walleska Fidelis Gomes Borges»	«Diretora da Assistência Farmacêutica»	«19/02/2022»
Atualização	«Viviane Corrêa de Almeida Fernandes»	«Farmacêutico»	«16/02/2022»