



**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
CÂMARA TÉCNICA DE DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES PARA O MANEJO DA COVID-19**

FORMULÁRIO DE DISPENSACÃO DE ENOXAPARINA AMBULATORIAL PARA COVID-19

- 1) Nome do paciente:
- 2) Apresentação: () 40mg () 60mg () 80mg
- 3) Posologia: () 1 x dia () 2 x dia
- 4) Duração do tratamento:
- 5) Critérios para escolha do medicamento:

Estratificação de risco trombótico (indicado uso em pacientes com escore ≥ 4 pontos)*:

- | | |
|--|---|
| () Cancer ativo (exceto cutâneos localizados): +3 pontos | () ICC ou DPOC: +1 ponto |
| () TVP prévia: +3 pontos | () IAM ou AVC recente (1 mês): +1 ponto |
| () Redução de mobilidade (>50% do período de vigília acamado): +3 pontos | () Infecção aguda e/ou doença reumatológica: +1 ponto |
| () Trombofilia: +3 pontos | () Obesidade (IMC ≥ 30 kg/m ²): +1 ponto |
| () Cirurgia ou trauma há 1 mês (com comprometimento da mobilidade): +2 pontos | () Contraceptivo, reposição ou terapia de reposição hormonal: +1 ponto |
| () Idade ≥ 70 anos: +1 ponto | Total de pontos = |

Fonte: Adaptado - Padua Predicon Score

***Observações:**

1 - A dosagem sérica de d-dimero isoladamente não é considerada parâmetro para indicação de uso de Enoxaparina

2 - Não é recomendado o uso de Enoxaparina para paciente com elevado risco de sangramento

Médico(a): Data:

Nome e carimbo c/ CRM: